

Hoja de Divulgación

Floración de cerezo 'Brooks' en los oasis productivos Norte y Valle de Uco

La Dirección de Agricultura realizó el seguimiento fenológico de las principales variedades de cerezo destinadas a la industria en los cuatro oasis productivos de Mendoza.

Metodología

En cada oasis se relevaron tres fincas. En cada finca se seleccionaron dos plantas representativas y, en cada una, dos ramas con distinta orientación: Norte-Sur en una y Este-Oeste en la otra, con el fin de integrar la información proveniente de los cuatro puntos cardinales.


En cada rama se delimitaron 100 yemas florales, que fueron evaluadas dos veces por semana para registrar su evolución desde corola visible hasta fruto cuajado.

Resultados: comportamiento de floración de 'Brooks' en 2025

'Brooks', una de las variedades de cerezo les más difundidas en los oasis Norte y Valle de Uco, fue monitoreada a lo largo de todos los estadios fenológicos.

El estadio de flor abierta fue el de mayor interés, ya que su máximo define la Plena Floración, momento clave que marca el inicio del desarrollo del fruto.

En el gráfico adjunto se observa la dinámica de floración en los distintos oasis:



La floración de ‘**Brooks**’ mostró diferencias marcadas entre los oasis evaluados:

- **Oasis Norte:** presentó una floración **más temprana**, iniciando alrededor del **18 de septiembre** y alcanzando su **Plena Floración** el **22 de septiembre**, con un 60 % de flores abiertas. Posteriormente, el porcentaje se mantuvo estable por algunos días antes de comenzar su descenso hacia fin de mes.
Esto indica una floración **más concentrada y corta**, con un rápido avance y finalización del proceso.
- **Oasis Valle de Uco:** registró un **inicio más tardío**, pero con un ascenso sostenido que alcanzó su **máximo superior al 90 %** de flores abiertas el **26 de septiembre**, unos **tres días después del Norte**. El descenso fue gradual, extendiéndose hasta los primeros días de octubre.
Esto refleja una floración **más prolongada y escalonada**, lo que podría estar asociado a temperaturas más bajas y menor acumulación térmica.

Conclusiones

En resumen, la variedad ‘Brooks’ mantuvo una diferencia de **4 días en la Plena Floración** entre oasis, mostrando la **influencia del ambiente** sobre el ritmo de apertura floral.

Fechas de Plena Floración

Oasis	Fecha de Plena Floración
Norte	22 de septiembre de 2025
Valle	26 de septiembre de 2025

Versión breve para difusión técnica

Durante la campaña 2025, la floración de ‘Brooks’ mostró diferencias entre oasis.

El Norte fue el más temprano en alcanzar la Plena Floración, mientras que el Valle presentó un desarrollo más lento, llegando a esa etapa el 26/09.

En síntesis, en solo cuatro días (del 22 al 26 de septiembre) se concentró la Plena Floración de ‘Brooks’ en los principales oasis productivos de Mendoza.